

STOP 農作業事故

さくらんぼに関する農作業事故防止運動強化期間

5月24日～7月10日

当 面 の 技 術 対 策

(6 月)

令和元年5月30日

西置賜農業技術普及課

6 月 の 技 術 対 策

I	安全・安心な農産物生産及び環境保全型農業の推進	P 1 ~ 2
	1 安全・安心な農作物の生産	
	2 農薬の飛散（ドリフト）防止	
	3 環境保全型農業への積極的な取り組み	
	4 農作物残さ等の適正処理等の推進	
II	稲作	P 3 ~ 4
	1 初期生育の確保	
	2 作溝・中干しの励行	
	3 除草剤の効果的な使用	
	4 葉いもち防除	
	5 斑点米カメムシ類防除	
	6 湛水直播栽培の管理	
III	畑作	P 5 ~ 6
	1 大豆の土壌管理と播種	
IV	果樹	P 7 ~ 9
	1 さくらんぼの管理	
	2 りんご、西洋なし、ももの摘果	
	3 ぶどうの管理	
	4 病虫害防除	
V	野菜	P 10 ~ 12
	1 トンネル野菜の着果安定	
	2 ハウス野菜の生産安定	
	3 露地野菜の生産安定	
	4 梅雨期の排水対策	
	5 病虫害防除	
VI	花き	P 13 ~ 14
	1 りんどうのセル成型苗の定植	
	2 トルコギキョウの定植と短日処理	
	3 梅雨期の排水対策	
	4 病虫害防除	
VII	畜産	P 15 ~ 16
	1 家畜の衛生管理	
	2 家畜の飼養管理	
	3 飼料作物の管理	
	4 放牧場の管理と受胎率の向上	
	5 家畜排せつ物の適切な管理と利用の促進	

I 安全・安心な農産物生産及び環境保全型農業の推進

【6月の重点事項】

- 病虫害発生予察情報等を活用して的確な病虫害防除を行う。
- 病虫害の発生しにくい環境づくりに努める。
- 農薬を使用する際は、必ずラベルの記載内容を確認し、使用基準を遵守する。
- 農薬散布に当たっては、飛散防止対策を徹底するとともに、散布後は防除器具の洗浄をしっかりと行う。
- 土づくりによる地力の向上を図るとともに、化学肥料や化学合成農薬を低減した持続性の高い農業生産方式の導入を推進する。

1 安全・安心な農作物の生産

- (1) 病虫害防除所で提供する発生予察情報や防除情報等を積極的に活用し、各地域で発生する病虫害に対して的確な防除対策を講じる。
- (2) 病虫害の発生しにくい環境づくりのため、耕種的対策や物理的対策を組み合わせ、農薬のみに頼らない防除対策の指導を図る。
- (3) こまめな圃場観察による病虫害の早期発見と、正確な診断に基づく適切な対策を講じる。
- (4) 農薬使用に当たっては、農林水産省登録番号のある農薬を使用するとともに、農薬使用基準（適用作物、使用濃度や使用量、使用回数及び収穫前使用日数）や農薬ラベルに記載されている注意事項を遵守する。
- (5) 農薬には、ミツバチやマルハナバチなどの有用昆虫に対し長期間影響のある薬剤があるので、薬剤の選定に留意するとともに、養蜂業者等に対して防除計画の事前周知を行う等連携を密にし、事故防止に努める。
- (6) 合成ピレスロイド剤等を使用する場合は、市町村農作物有害動植物防除協議会等で定めた地区に限って使用し、蚕・魚類に対する被害を防止する。
- (7) 農薬に対する耐性菌・抵抗性害虫出現防止のため、同一成分の農薬の連用にならないよう薬剤を選択する。
- (8) 薬剤散布に当たっては、周辺の住民、河川等の周辺環境、周辺作物に十分配慮し、飛散防止策を講じる等地域住民や養蚕農家、たばこ耕作者、養蜂業者等に損害が生じないようにする。
- (9) 収穫作業の前には、記帳した防除実績と使用した農薬の使用基準を必ず確認する。特に、収穫時期が早まる場合等は、収穫前使用日数に注意する。

2 農薬の飛散（ドリフト）防止

- (1) 風向と風速
風が強いときや日中の散布を避け、風の弱い早朝や夕方に行う。風下に他作物や河川、住宅等がある場合は、特に注意を払う。
- (2) 散布方法
園地の端部では園地の外側から散布する。特に、スピードスプレーヤ（SS）で散布する場合は農薬が飛散しやすいので、端列は手散布で対応する。
- (3) 散布圧力・風量
粒径が細くなるため、散布圧力を上げすぎないようにする。また、SSで散布する場合は、過大な風量とならないように散布する。

ノーマス、ノー事故、農作業。家族や仲間と声掛け合って、農作業事故をなくしましょう。

- (4) 散布ノズル
使用目的に合わせた適度な噴霧粒径のノズルを選択する。ドリフト低減型ノズルも有効である。
- (5) 適正な散布量
散布量が多くなるほど飛散しやすくなるので、作物の生育量に合わせた適正な散布量とする。
- (6) 近接作物生産者との連携・調整
近接作物の収穫時期を考慮した散布計画、散布時期、緩衝地帯設定の協議等、近隣作物の生産者と十分に連絡をとる。
- (7) ネット・遮蔽シート等の設置
境界での防風ネット設置やソルゴー等障壁作物を周辺に植栽する。ドリフトが懸念される作物をシートで被覆する。
- (8) 飛散しにくい剤型の利用
粉剤や液剤を粒剤等のドリフトしにくい剤型に変更する。
- (9) 有人ヘリ、無人航空機を使用するときの対策
風速などの作業環境に注意し、国の通知等で定められた散布方法（飛行高度、飛行速度等）を遵守するとともに、関係機関、団体が連携して事前周知等の被害防止対策に努める。
- (10) その他
農薬使用後は速やかに調合タンク、ホース等の散布器具を洗浄する。洗浄に当たっては洗い残しがないように注意する。

3 環境保全型農業への積極的な取組み

- (1) 堆肥等の地域有機性資源を活用した土づくりを推進し、地力の向上を図る。
- (2) 土壌診断等により、土壌の養分状態を考慮した土づくりと施肥を行う。
- (3) 堆肥を施用した場合は、堆肥由来の肥料成分を考慮した施肥を行う。
- (4) 肥効調節型肥料の利用や局所施肥技術等の導入により、肥料成分の利用効率の高い施肥法を推進する。
- (5) 病害虫の発生しにくい環境づくりのため、耕種的対策や物理的対策を組み合わせ、農薬だけに頼らない防除対策の指導を図る。（再掲）
- (6) 環境保全型農業直接支払交付金等を活用し、化学肥料や化学合成農薬を低減した持続性の高い農業生産方式の導入に加え、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動の導入を促進する。

4 農作物残さ等の適正処理等の推進

- (1) 稲わらや剪定枝等の農作物残さ等のうち、循環利用が可能なものは資源として適正に利用を進める。
- (2) 資源として利用できない農作物残さ等は一般廃棄物に該当する。廃棄物の焼却は法律により原則禁止されており、市町村等の焼却処分場等で処理する。
- (3) 「農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」については、焼却禁止の例外とされているが、「やむを得ないものとして焼却できるか」の判断については、農家等が自己判断せず、農作物残さなどが発生した市町村の廃棄物担当課に確認する。

ノーマス、ノー事故、農作業。家族や仲間と声掛け合って、農作業事故をなくしましょう。

Ⅱ 稲 作

【6月の重点事項】

- 保温的水管理により初中期の生育量を確保する。
- 活着後は浅水で分けつの発生を促進させる。低温時は深水で稲体を保護する。
- ワキが発生したら、速やかに水交換や夜間落水により還元状態を改善する。
- 生育量を確保したら、中干しで生育を調整する。
- 直播の苗立ちは良好である。除草剤を適正に使用し、雑草を管理する。

1 初期生育の確保

- (1) 活着後は2～3 cm程度の浅水で管理し、分けつの発生を促進する。低温の日は深水にして稲体を保護しながら、日中止水、夜間灌水を徹底し、適正生育量の確保に努める。
- (2) 中山間・山間部で灌溉水温が低いところは、温水チューブ等により水温の上昇を図り、初期生育を促進させる。初期生育が確保しにくい中山間地域等で活着期追肥を行う場合は、活着を確認してから控えめな量で行う。
- (3) 土壌の還元程度を確認し、異常還元（ワキ）や表層剥離が見られる場合は速やかに水交換を行う。ワキが強く、生育停滞が見える場合は、温かい日に田干しや夜間落水を行い、還元状態の改善に努める。
- (4) 特に、「つや姫」及び「雪若丸」は、より高品質で良食味に仕上げていくことが大事であるため、栽培方法を遵守しながら、適正な生育量を確保するように、きめ細やかな栽培管理を実践する。

2 作溝・中干しの励行

- (1) 有効茎を確保したら速やかに作溝・中干しを行い、生育量のコントロールと稲体の健全化に努める。生育が過剰になりやすい圃場や鉄コーティング直播栽培では有効茎確保前でも早めに中干しを実施する。中干しは、登熟期の根量増加や根の活力向上に効果があり、籾数の制御や収穫作業の効率化につながることから、時期を失せず早めに実施することがポイントである。
- (2) 作溝は中干しの効果を高め、水管理を効率的に行い、地耐力をさらに高める重要な技術であるため、中干しと併せて実施する。

3 除草剤の効果的な使用

- (1) 除草剤は、使用基準に従って適正に使用する。一発処理除草剤は薬剤により処理時期や持続性が異なる。また、剤型によって使用時の条件や留意点等が異なるので、剤の特性を十分考慮して使用する。
- (2) スルホニルウレア（SU）系除草剤抵抗性雑草（アゼナ類、イヌホタルイ、オモダカ等）が発生する圃場では、効果のある有効成分を含む体系処理又は一発処理除草剤を使用する。
- (3) 中期除草剤の高温下での使用は薬害が発生しやすいので、使用条件に注意する。なお、ジャンボ剤を使用する場合は、藻類等が発生していると拡散が不十分となり薬害が発生したり効果が劣ったりするので、事前に藻類等を処理しておくか、別の剤型に変更する。

4 葉いもち防除

- (1) 葉いもちの発生を防止するため、不要になった苗は直ちに処分する。また、地域全体で取り置き苗の一斉除去日を設定するなど、組織的に排除に努める。

ノーマス、ノー事故、農作業。家族や仲間と声掛け合って、農作業事故をなくしましょう。

- (2) 圃場の見回りをこまめに行い、葉いもちの早期発見、早期防除に努める。また、葉いもち防除のために育苗箱施用薬剤を使用しても、圃場巡回、観察を行い、早期発見に努める。
- (3) 葉いもちの防除を水面施用剤（粒剤、パック剤、ジャンボ剤等）で行う場合は、6月20日頃までに散布し、散布後4～5日は湛水状態を保ち、7日間は落水やかけ流しはしない。

5 斑点米カメムシ類防除

斑点米カメムシ類の防除は、地域が一体となった組織的な活動を展開し、被害防止を図る。

- (1) 日頃から農道や畦畔等の草刈りを励行してカメムシ類の密度低減を図る。
- (2) 休耕田はカメムシ類など害虫の生息場所になりやすいので、草刈りや耕耘などにより除草を徹底する。
- (3) 転作田や河川、高速道路の法面等、カメムシ類の生息地になりやすい場所での雑草管理については関係機関との連携を密にして、管理者から合意を得ながら、適切な対策を行い、カメムシ類の生息場所を減少させる。
- (4) 水田内のノビエやホタルイ、カヤツリグサ等の雑草も斑点米カメムシ類の生息地になるので、水田内の除草を徹底する。
- (5) 必要な対策を講じても結果的に例年被害が多い地域は、収穫前から色彩選別機の導入を検討する。

6 湛水直播栽培の管理

本年の湛水直播栽培の発芽・苗立ちは良好である。今後は生育量を確認し、以下の点に留意して栽培管理を行う。

- (1) 適正な苗立数は、80～100本/m²である。苗立数が120本/m²を超える場合、3葉期に深水管理を行い4葉期に落水して茎数を抑制する。
- (2) 5葉期の適正茎数は250本/m²である。5葉期以降の管理は、茎数が過剰な場合5cm以上の深水管理を基本とする。生育が過小な場合は、浅水管理を続け、茎数確保を目指すとともに、5葉期追肥を行う。
- (3) 直播栽培は、移植栽培と比較して除草剤処理後の残草が多くなりやすいので、圃場をよく確認し、残った雑草の草種や発生量、生育等に合わせて剤を選択して使用基準に従って正しく除草剤を散布する。
- (4) 葉いもちの水面施用剤による防除は、移植栽培と同様に行う。また、薬剤を種子処理した場合でも圃場巡回、観察を行い、早期発見に努める。
- (5) 鉄コーティング直播栽培は、土壌の表面播種となり、土中播種に比べ倒伏しやすいため、草丈を過剰に伸ばさない、茎数を過剰に増やさない管理が重要である。

Ⅲ 畑 作

【6月の重点事項】

<大豆>

- 排水対策と土壌 pH の調整等の土づくりは、必ず実施する。
- 新たな品種や技術の導入を検討し、より高いレベルの収量を目指す。
- 中耕・培土で排水を良くするとともに、耕種的な雑草防除をする。

<麦類>

- 出穂期は平年よりやや早いので、刈取りは平年より早めの日程で準備をする。

1 大豆の土壌管理と播種

(1) 土壌診断と適確な対応

土壌の作土深や土壌硬度、排水能力等を確認し、サブソイラーやスタブルカルチなどで土壌物理性の改善を行う。また、耕耘前に土壌 pH を測定し、大豆に最適な条件である pH6.0～6.5 になるように必要な資材を投入し、土壌改良を行う。

(2) 土壌砕土率の向上

出芽勢を良くし、土壌処理除草剤の効果を高めるため、丁寧な耕起作業を行い、砕土率の向上を図る（目標 70%）。極端に乾燥が進んだ場合は、降雨後の適度な土壌水分状態にしてから耕耘することで砕土率を上げることができる。

(3) 播種期と栽植密度

大豆の播種期は、収量、品質に与える影響が大きく、適期内播種（5月下旬から6月上旬まで）が重要となる。なお、栽植本数は、5月下旬～6月上旬播種で 13,000～15,000 本/10a である。播種時期が6月中旬になる場合は 18,000 本/10a 程度を目安とし、生育量を確保する。

コンバイン収穫時の汚損粒の発生を防止するため、コンバインのクローラ幅に合わせて畝幅を決定し、株間で適正栽植密度に調整する。

また、例年ネキリムシ類の被害が見られるところでは、種子への薬剤処理、または、播種時の薬剤防除を行う。

(4) 新技術・新品種の導入

大豆栽培では、畝立てしたところに種子を播き湿害の軽減を図る「耕耘同時畝立て播種技術」や「小畦立て播種技術」、播種と同時に深さ 15～20cm のところに肥料を落とす「小畝立て深層施肥播種技術」など、収量や品質を高める技術が開発されている。

さらに、大粒で収量が高く、品質も良好な「里のほほえみ」は本県を中心に栽培が広がってきており、大粒でしわ粒が少ない早生品種「シュウリュウ」も栽培が始まっている。これらの新技術や新品種の導入などで収量・品質の向上を図る。

(5) 排水対策の徹底

梅雨期に備えて排水溝の整備や手直しを行い、大雨があった場合は、速やかに停滞水が排水されるか確認する。また、下葉の黄化や生育停滞などの湿害を受けた時は、作業が可能な土壌水分になったら速やかに中耕培土を行い、根圏環境を良好にする。

ノーマス、ノー事故、農作業。家族や仲間と声掛け合って、農作業事故をなくしましょう。

(6) 中耕培土

中耕培土は排水対策、根域の拡大による養分吸収促進、根粒菌の活性化、雑草抑制などの効果がある。特に酸素を多く必要とする根粒菌の活性化には効果が高く、大豆栽培では欠かせない技術である。1回目の培土時期は3葉期なので、時期を失しないよう確実に実施する。なお、1回目の培土は中耕を兼ねて子葉節の高さまで軽く行う。

また、降雨が続き、適期に中耕培土作業ができないまま開花期になったとしても、生育量が不足している場合は、晴れ間を見てできるだけ中耕培土作業を行い、根の活力を回復させる。

Ⅳ 果 樹

【6月の重点事項】

- さくらんぼの適切な管理(灌水・着色管理)を実施するとともに、適期収穫、厳選出荷を徹底する。
- さくらんぼの雨除け被覆や収穫作業、りんごや西洋なしの摘果作業など、高所での作業が多くなるため、農作業安全に配慮し事故防止に努める。

農作業は計画的に、休息を取りながら、安全に！

1 さくらんぼの管理

(1) 灌水

着色期以降は、多量の灌水ではなく、少量の灌水を行う。高温・乾燥が続く、朝から葉の下垂が続くような場合は、3～4日間隔で樹冠下に少量(1,000～2,000ℓ/10a)の灌水を行う。特に、「紅秀峰」は「佐藤錦」よりも水分が必要なため、土壌水分をやや多めに管理する。

(2) 着色管理

ア 支柱立て、枝吊り、誘引

摘心や葉摘みを行う前に支柱立て、枝吊り、誘引を行うことで日当たりが改善され、余分な摘心や葉摘みを省き、着色管理の作業効率を上げることができる。果実の重みで下垂した枝は、枝の先端が上向きになるように支柱の設置や枝吊りを行う。また、側枝の間隔が狭くなっている場所は、空いている空間に誘引を行う。

イ 新梢管理

下枝まで十分に光が届くように、日当たりを悪くしている徒長枝(新梢)を基部から切除する。新梢の整理は、幹周りや主枝の基部、枝の分岐の近くを主体に行い、大枝の中間から先端部の新梢は切除しない。また、新梢管理は樹勢低下につながるため、樹勢を判断しながら実施する。

ウ 修正摘果の実施

着果程度を適正にすることで、着色が向上する。着果程度を再確認し、多い部分はハサミを使い、修正摘果を実施する。

なお、着色期に入ってから摘果を行う場合は、ショウジョウバエ防除対策のため、摘除した果実は園地内に放置せず、拾い集め適切に処分する。

エ 反射シートの設置

反射シートは、着色始期に設置する。設置効果を高めるため、事前に草刈りを行い、地面の凹凸がないようにしておく。設置する面積は、全体の50～60%を覆う程度とする。

収穫期に高温が続く場合は、反射シートを撤去する。

オ 葉摘み

葉は、果実の糖度や着色の向上に重要な役割を果たしている。早過ぎる葉摘みや摘み過ぎは、品質低下の原因になるほか、来年の花芽の充実にも悪影響を及ぼすので注意する。

葉摘みの時期は、着色がある程度(30%程度)進んでから行う。葉摘みは、果実の間に潜り込んだ小さい葉と、果実に覆いかぶさっている葉を摘む程度にとどめ、短果枝に大きな葉が4～5枚残るようにする。

ノーマス、ノー事故、農作業。家族や仲間と声掛け合って、農作業事故をなくしましょう。

(3) 適期収穫と厳選出荷

今年の収穫期は、前年より5日程度遅く、平年並みになると見込まれる。園地をよく観察し、着色程度や食味を確認したうえで収穫する。「佐藤錦」では満開後50～55日、「紅秀峰」では満開後65日前後が収穫期の目安となるが、「紅秀峰」は収穫が早いと渋味が残るので、必ず食味を確認したうえで収穫する。

着色期～収穫期に好天が続くと、日当たりの良い部分や2年枝基部の果実に高温障害が発生しやすいので、成熟の進んだ果実を選びもぎする。また、収穫期の後半はウルミ果の発生が多くなるので、着色にとらわれず収穫を進める。

果実の鮮度を保つため、収穫は朝の涼しい時間帯に行い、収穫後もできるだけ早く涼しい場所に移す。さらに、収穫カゴの内側やコンテナにウレタン等を敷き、選果台に移す時も果実が傷まないように丁寧に取り扱う。また、出荷規格を守り厳選出荷に努める。

2 りんご、西洋なし、ももの摘果

(1) りんごの摘果は、果形や肥大が良い中心果を、4頂芽に1果の割合で残すのが基本となる。6月中旬までを目安に大まかに園地を一回りする。

(2) 西洋なしは、横向き～斜め上向きの短果枝、極短果枝を中心に、日当たりの良い部位に着果させると、果実に傷がつきにくく、品質の良い果実が得られる。仕上げ摘果は、4頂芽に1果を残し、6月上中旬までに実施する。

(3) ももの摘果は、核割れや生理落果を防止するため、一挙に強い摘果を行うことを避け、数回に分けて仕上げる。

硬核期（今年は6月中旬頃から7月上旬頃）に強い摘果を行うと、核割れを助長する場合があるので、仕上げ摘果は6月上旬までに行い、最終着果数より10～20%程度多めに残す。

3 ぶどうの管理

(1) 「デラウェア」の果房管理と裂果対策

ア 「デラウェア」のハウス栽培では、露地栽培よりも果実品質に対する着果負担の影響が出やすい。着房数が多い場合や果房が大きい場合は着色不良、糖度不足の大きな要因になる。

摘房と併せて、大房になった果房は上部枝梗を切除し、L級中心の房に揃える。着粒数が多く密着する恐れがある場合は、早めに摘粒を行う。

イ 7月以降の降雨による裂果を少しでも軽減するため、果粒軟化期前に、摘房や摘粒等の房づくりを徹底するとともに、灌水を行い、果粒の初期肥大を促進する等の対策を講じる。併せて、梅雨期に備え、園地内及び園地周囲に排水路を設置する。

(2) 「シャインマスカット」の花穂整形と無核化处理

ア 「シャインマスカット」の果房品質の目標は、果房重：600～800g、果粒重：15g程度、着粒数：40～50粒とする。そのための花穂整形（無核栽培）は、開花始期で房先3.5cm（咲き始め3.0cm、満開期4.0cm）を目安にする。

イ 無核化を安定させるために、満開予定日14日前から開花始期までに、ストレプトマイシン剤の200ppmを散布または浸漬処理する。

ノーマス、ノー事故、農作業。家族や仲間と声掛け合って、農作業事故をなくしましょう。

第1回のジベレリン処理は満開3日後とし、ジベレリン25ppmにフルメット液剤2～3ppmを加用する。なお、開花時期の揃いが悪い場合は、生育に合わせて2～3回に分けて処理すると良い。第2回ジベレリン処理は、満開10～15日後に25ppmで行う。

ウ 樹勢が強い樹や伸びが旺盛な新梢は、開花前（展葉10～11枚時）に、新梢先端を軽く摘む摘心を行うと、着粒が安定する。

4 病害虫防除

- (1) 6月は、さくらんぼの灰星病及びショウジョウバエ、りんご黒星病及び斑点落葉病、西洋なし輪紋病及び胴枯病、ぶどう晩腐病及びクビアカスカシバ等の各樹種の主要病害虫の防除時期になるため、発生状況をよく観察し、早期発見に努め、ドリフトに十分注意しながら防除を徹底する。
- (2) りんご黒星病の薬剤防除は、10日間隔の防除を基本とし、防除予定日に降雨が予想される場合は、計画を前倒しして降雨前に実施するとともに、次回の防除間隔があきすぎないように注意する。防除に当たっては、散布ムラが無いように十分な薬液量をていねいに散布する。
- (3) 近年、西洋なしの胴枯病及び腐らん病による枝枯れが多く見られる。枯死枝は伝染源になることから、枯死枝を見つけた場合は速やかに切除し、園外に持ち出して適切に処分する。

V 野 菜

【6月の重点事項】

- すいか等露地トンネル栽培は適正な草勢管理と温度管理の徹底で着果の安定を図る。
- ハウス果菜類は、着果量に応じた適正な肥培管理を行い、草勢を維持する。
- 露地野菜類では、計画的に作業準備を行い、遅れずに播種やその他管理作業を行う。
- 梅雨入り前に明渠の設置、排水口の確認等、排水対策を徹底する。

1 トンネル野菜の着果安定

(1) すいかの開花前、着果期の管理

つる引き栽培では、交配1週間程前に、目標着果節位がトンネル中央付近になるようにつるを引き戻す。また、着果節までの不要な側枝を除去し、つるが等間隔になるように配置する。つる引きは着花位置を揃えるため、必要に応じて複数回行う。

トンネル移動栽培では、つる先がトンネル内から出る直前頃を目処に、目標着果節位がトンネルの中央になるようにトンネルを移動させるが、必要に応じてつる引きを併用し着果位置を揃える。

交配2～3日前からトンネル内温度をやや高めに管理し、確実な着果を図るとともに、初期肥大を促進させる。果実が鶏卵大になったら、できるだけ大きさが揃ったものを残し、①孫づる着生果、②変形果、③傷果、④尻太りや正球型のもの、⑤縞の色が濃いもの等除去して、目標の果数（概ね株当たり2果×定植本数）を確保する。

2 ハウス野菜の生産安定

(1) きゅうりの草勢維持と生産安定

展開してから50日以上経過した古い葉は光合成能力が低下し、呼吸による養分消費の方が大きくなるため、古い葉を摘葉し、光合成能力の高い若い葉に十分光が当たるようにする。一度に多くの葉を摘葉すると草勢が弱くなるので、1回の摘葉は株当たり1～2葉とする。また、葉色、幼果、巻きひげや側枝の発生状況等、生育状況をよく観察し、適正な温湿度や養水管理に努め、草勢低下を防止する。

(2) トマトの栽培管理

多雨時にハウス周囲から水が侵入すると、裂果の多発や、草勢バランスの崩れによる、障害果の発生等を引き起こし、収量低下につながることから、入梅前にハウス周囲に明渠の設置、排水路の確認等、排水対策を十分に行う。

長期どり夏秋栽培では、第6花房が開花する頃まで第1花房の収穫ができないため、6月下旬には着果負担が最大となり、草勢低下を招きやすい。生育途中で一旦草勢が弱くなると、草勢の急な回復は困難であるため、第3花房が開花する6月上旬頃から生長点付近の状態を良く観察し、遅れずに適切な灌水と肥培管理を行い、草勢維持を図る。また、この時期のトマトは生理障害が発生しやすいことから、必要に応じて微量要素入りの液肥や葉面散布肥料等により

ノーマス、ノー事故、農作業。家族や仲間と声掛け合って、農作業事故をなくしましょう。

対応する。

マルハナバチを利用する場合、巣箱への日除けの設置等、高温対策を行う。また、使用にあたっては、施設開口部のネット張りによる逃亡防止、農薬の適正使用、放飼面積の適正化（ハウス間の巣箱移動）に努める。

3 露地野菜の生産安定

(1) 晩生えだまめの播種期

「秘伝」等、9月中下旬に収穫する晩生えだまめは、6月上中旬頃を目処に播種を行う。「秘伝」は比較的発芽が良好で、直播き栽培が可能であるが、鳥害対策が不可欠である。また、タマナヤガ等ネキリムシ類による被害を受けやすいので、発消長等の情報を確認し薬剤防除を徹底する。

(2) ねぎの土寄せ

土寄せは3～4回に分けて行う。早すぎると生育が抑制され、遅れると肥大は良くなるが、葉鞘のしまりが悪くなる。定植後30～40日後に1回目、その20～30日後に2回目を行うことを目安に、生育に応じて実施する。

(3) アスパラガス

春どり栽培の収穫打ち切り時期は、収量、品質の推移と前年の株養成状況を考慮し、定植5年目以降の成園では、収穫開始後55日頃を基準とする。収穫終了後は、除草、収穫残茎の整理、施肥、土寄せ等、一連の管理を行い、次年度の株養成に努める。また、茎葉が倒伏しないように支柱及びマイカ線やフラワーネットを設置する。

二期どり栽培は、5月下旬頃から、太さがMクラスの茎を1m当たり約10～15本、約10cm間隔となるよう立茎を開始する。立茎前に支柱及びフラワーネット等を設置して茎が倒伏しないように誘引し、萌芽する茎を順次収穫する。

4 梅雨期の排水対策

梅雨期は局地的に大雨が降ることがあるので、あらかじめ排水対策を十分行う。特に、転換畑では排水不良になりやすいため、圃場で水が停滞しないように明渠、暗渠を組み合わせる確実な排水対策を徹底するとともに、地下水が高く水の停滞しやすい圃場では、高畝栽培により湿害を低減させる。

施設栽培では、施設周囲に明渠を設置するとともに、ビニールや畦シート等を用いて、地下部から施設内への雨水の浸透を防止する。また、急な浸水に対応できるように排水ポンプを準備しておく。

5 病虫害防除

(1) 降雨が続くと露地のきゅうり、メロンで斑点細菌病、トマトで灰色かび病が多発しやすいので、天候の変化に対応し適宜防除を行う。また、アスパラガスの春どり栽培では、収穫打ち切り後、茎枯病等の防除を徹底する。

(2) すいかの炭そ病、疫病の発生を防止するため、排水対策を徹底するとともに、降雨が続く場合には散布間隔を短くして防除する。また、細菌病害の発生防止のため、銅剤を組み合わせた防除体系とし、県病虫害防除基準等を参考に防除を行う。

(3) ねぎの培土は断根を伴い、培土後は生育が一時停滞し病害が発生しやすくなる。このため、培土2～3日前に予防防除を行う。軟腐病が発生する圃場では、

ノーマス、ノー事故、農作業。家族や仲間と声掛け合って、農作業事故をなくしましょう。

土寄せ時に粒剤処理を行う。

- (4) メロンえそ斑点病が発生するハウスでは、施設の計画的な利用を行うとともに、発病抑制効果のある抵抗性品種や台木を使用する。品種の選定に当たっては、組織的に対応を検討し、防除効果を高める。

VI 花 き

【6月の重点事項】

- りんどうやトルコぎきょう等は定植期となるため、計画的に適期定植を行う。
- 梅雨期は各種病害が発生しやすい時期となることから、早期発見・早期防除を心がける。
- 局地的な大雨に備え、明渠や暗渠など排水対策の徹底を図る。

1 りんどうのセル成型苗の定植

- (1) りんどうのセル成型苗の定植適期の苗齢は、200穴セルトレーで育苗した場合、播種後80～90日、本葉3対葉程度である。老化苗は定植後の根張りが悪く、生育不良の原因となる。定植は苗の活着と作業性から梅雨期直前が良く、作業が遅れないよう圃場の準備を進める。
- (2) 定植直前の苗にジベレリン100ppm水溶液を葉が十分ぬれる程度茎葉散布すると、多くの品種・系統で定植当年の生育が促進され、翌年伸長する芽（越冬芽）の質及び量ともに優れる。本葉3対葉未満の若齢苗へ処理した場合や散布量が少なかった場合、高所ロゼットのような異常な茎が多発することがあるので、苗の数や生育量に合わせて薬液量を調整して散布する。

2 トルコぎきょうの定植と短日処理

- (1) 9月出し作型の定植は、6月中旬から下旬が適期である。ハウス内地温の昇温防止のため、定植1週間前頃から遮光率40%程度の遮熱資材を屋根面に被覆する。また、TSWV等のウイルスを予防するため、ハウスサイドは白寒冷紗等で被覆し、媒介昆虫であるアブラムシ類やアザミウマ類の侵入を防ぐ。
- (2) 定植適期の苗齢は、288穴セルトレーを使用して育苗した場合、播種後50～55日、本葉2.5対葉程度、406穴セルトレー等を使用して育苗した場合、播種後45～50日、本葉1.8～2.0対葉程度である。
- (3) 定植は、植え穴にセル成型苗を置く程度とし、株元は鎮圧せず、定植後に散水ノズル等で十分に灌水する。屋根面に被覆した遮熱資材の撤去は、苗が活着するまでの定植後7～14日程度を目安とし、夕方に作業する。
- (4) 生育初期の灌水は、根の伸長と新根の発生を促すため、本葉5～6対葉が展開するまで十分に行う。定植から1か月程度は、灌水チューブや散水ノズル等で株元の土の表面が乾かないように管理する。
- (5) 葉先枯れ症状の発生を軽減するため、活着期以降は循環扇等を利用して通風を良くする。例年、葉先枯れ症状の発生が多い圃場や、初期生育の旺盛な品種では、定植3週間目頃から発蕾期頃までカルシウム資材の葉面散布肥料で茎葉散布を定期的に行う。
- (6) 10月～11月出し加温シェード作型では、6月中旬から7月中旬にかけて定植を行う。短日処理は、専用の被覆資材を利用して、日長9時間（明期8時～17時）に制御する。また、夜間開放（例：20時～翌日3時）を行い、涼しく管理すると開花抑制効果が高まる。

ノーマス、ノー事故、農作業。家族や仲間と声掛け合って、農作業事故をなくしましょう。

3 梅雨期の排水対策

- (1) 梅雨期は降水量が多くなり、また、近年は局地的に大雨となることがあるので、あらかじめ排水対策を徹底する。
- (2) 露地栽培（特に、転換畑）では、排水不良になりやすいので、圃場で停滞水が発生しないように明渠と暗渠を組み合わせて確実な排水対策を徹底するとともに、地下水が高く水の停滞しやすい圃場では高畝栽培とする。
- (3) 施設栽培では、施設周囲に明渠を設置するとともに、ビニールや畦シート等を用いて施設内への雨水の浸透を防止する。

4 病虫害防除

- (1) 露地花きでは、きくの白さび病、りんどうの葉枯病と褐斑病などに注意するとともに、害虫ではアブラムシ類、ハモグリバエ類、オオタバコガなどの発生に留意し、早期発見に努め、晴れ間をみて効率的に防除を行う。
- (2) 施設花きでは、トルコぎきょう、スターチス類等の灰色かび病に注意する。灰色かび病は、ハウス内湿度が高まり、空気が停滞すると多発しやすいことから、晴天日や曇天日は、ハウスサイドの換気口を大きく開けるとともに、循環扇を利用して通風を良くする。また、雨天日は、循環扇の利用に加えて、除湿のための冷暖房を行い、耕種的防除と合わせた総合防除に努める。
- (3) ミカンキイロアザミウマ等のアザミウマ類が媒介するTSWVやINSVの被害が県内で発生していることから、アザミウマ類の初発生に注意するとともに、発生が見られたら防除基準等を参考に速やかに防除を実施する。

Ⅶ 畜 産

【6月の重点事項】

- 家畜飼養衛生管理基準を遵守し、周辺環境を適正に管理する。
- 気温や湿度の上昇による家畜の熱中症や飼料の劣化に注意し、早めに暑熱対策に取り組む。
- 梅雨入り前に牧草の収穫調製を行い、収穫後、追肥する。
- 放牧場での発情観察を徹底する。
- 家畜排せつ物処理施設を適切に管理する。

1 家畜の衛生管理

梅雨期の高温多湿条件下では、細菌性疾病をはじめ、各種疾病や害虫発生が懸念される。また、国内においては、26年ぶりの豚コレラの発生、またアジアでは、継続的に豚コレラやアフリカ豚コレラ、そして口蹄疫等の発生が確認されている。そのため、依然として、人や物、そして野生動物を介した侵入リスクが高い状況にあることから、「飼養衛生管理基準」を基本とした衛生管理を徹底する。

豚コレラの対策としては、飼料に肉を含む場合、又は含む可能性がある場合は、あらかじめ摂氏70度・30分以上、又は摂氏80度・3分以上の加熱処理を徹底する。そして敷地内への消石灰散布等、病原体の侵入を防ぐための対策を講じる。

ハエなどの防除は、幼虫対策と成虫対策を組み合わせて行う。また、牛床の敷料交換と飼槽の清掃を入念に行うとともに、高水分の堆肥やサイレージ等はシートで被覆する等ハエが産卵しにくい環境づくりに努める。

※ 家畜の伝染病は、適切な衛生管理で発生を予防できる。「飼養衛生管理基準」を再確認し、農場出入口での車両等の消毒、踏み込み消毒槽の設置、専用長靴や専用衣服の整備等、人や物の出入りの管理を徹底し、病原体の侵入防止に努める。また、異状が見られた場合には、直ちに家畜保健衛生所に通報する。

2 家畜の飼養管理

今後、徐々に気温が高くなるため、直射日光の侵入防止など家畜の暑熱対策に早めに取り組む。また、梅雨期の家畜の熱中症を防ぐため、畜舎内の通風・換気を強制的に行い、畜舎内の室温及び湿度を下げ、家畜の体感温度が下がるように努める。また、おが屑やもみ殻等の敷料の交換回数を増やすとともに、送風機を利用して床の乾燥を促す。

サイレージ等の多汁質飼料は、品質の劣化が速くなるため、常に新鮮なものを給与し、1回当たりの給与量は、短時間で摂食可能な量とする。また、ウォーターカップ等給水設備の点検と清掃を励行するとともに、飼槽内の残飼が腐敗していないか確認し、清潔で冷たい水と新鮮な飼料を常に給与するように努める。

3 飼料作物の管理

牧草の1番草は、遅くとも梅雨入り前に収穫が終了するように計画的に作業を進める。収穫後は、年間施肥量の30%を目安に追肥し、牧草の再生促進を図る。

湿害の発生の恐れのある圃場では、あらかじめ、できるだけ深い明渠を施すなど排水対策を講じ、日頃から排水路の保守・点検に努める。

ノーマス、ノー事故、農作業。家族や仲間と声掛け合って、農作業事故をなくしましょう。

青刈とうもろこしが湿害を受けた場合は、表面停滞水等の排水促進を図るとともに、排水後に窒素成分で5 kg/10a程度の追肥を行い、生育の回復を図る。

4 放牧場の管理と受胎率の向上

この時期、放牧利用のみでは余剰草が生じるため、機械作業の可能な放牧場では、採草や転牧後の掃除刈りを行い、草勢の悪化を防ぐ。また、早春施肥をしていない草地では、6月下旬を目処に年間施肥量の半量を施用する。

放牧牛は、入牧直後のストレスから回復してきており、受胎に最も適した時期であることから、念入りに観察して発情発見に努め、適期授精による受胎率の向上を図る。

5 家畜排せつ物の適切な管理と利用の促進

畜舎、堆肥舎、堆肥処理施設及び周辺環境の点検により、家畜排せつ物を適切に管理し、雨水による流出防止を徹底する。良質な堆肥生産のため、副資材（粃殻やおが屑など）を用いて通気性を確保するとともに、定期的に切り返して好気性微生物の働きを促す。生産堆肥は耕種農家等と連携し、農地に散布する等有効活用を図る。

ノーマス、ノー事故、農作業。家族や仲間と声掛け合って、農作業事故をなくしましょう。